

Plazmaferézis indikációk nephrológiai kórképekben

- 1. ANCA-asszociált rapidan progrediáló glomerulonephritis, vagy vesebiopsziával igazolt ANCA negatív pauci-immun rapidan progrediáló glomerulonephritis**
 - Dialízisdependens és/vagy diffúz alveolaris haemorrhagiával járó esetek
 - Egyéni megítélés alapján: a dialízisdependens esetekben
 - (Terápiás javaslat: 1-1,5x, albumin vagy FFP DAH esetén, naponta-másnaponta, 6-9)
- 2. Antiglomerularis basalis membrán betegség (Goodpasture-szindróma)**
 - Diffúz alveolaris haemorrhagiával járó és/vagy dialízisre nem szoruló vagy dialízisre szoruló, de egyidejűleg ANCA-pozitív esetek
 - Egyéni megítélés alapján: a dialízisdependens esetekben, diffúz alveolaris haemorrhagia nélkül
 - (Terápiás javaslat: 1-1,5x, FFP majd albumin, másnaponta 10-15x, max. 4 hétig)
- 3. Vesetranszplantáció utáni acut antitest mediált rejectio**
 - vesebiopsziával igazolt aktiv/acut ABMR veseTx utáni első évben
 - 1-1,5x albumin, másodnaponta 3-5 alkalommal
- 4. Vesetranszplantáció után visszatérő fokális szegmentális glomerulosclerosis**
 - primer, idiopathiás rekuráló FSGS vesetranszplantációt követően 1éven belül
 - 1-1,5x, albumin, naponta-másodnaponta 5-10x,
- 5. Rapidan progrediáló vesebiopsziával igazolt nem pauci-immun glomerulonephritis**
 - egyéni megítélés alapján: pl. Henoch-Schönlein-purpura, IgA-nephropathia
 - 1-1,5x, albumin, 3-5x

Nem elsősorban nephrológiai kórképek, melyek járhatnak renális manifesztációval

Cryoglobulinaemiás glomerulonephritis

- extrarenalis tünetekkel is járó súlyos forma

Monoclonalis gammopathia hiperviszkozitással / cast nephropathiával

- hyperviscositas syndromában sürgősséggel vagy anti-myeloma kezelés ellenére dialízis igényű, vesebiopsziával igazolt cast nephropathia

Katasztrofális antifosfolipidszindróma

Thromboticus thrombocytopeniás purpura

Thromboticus microangiopathia

- komplementmediált H-faktor-autoantitestek

- gyógyszerrel összefüggő (Tiklopidin)

- Egyéni megítélés alapján: koagulációmediált THBD-mutáció, komplementmediált: komplementfaktor-génmutációk, MCP-mutációk, gyógyszerrel összefüggő: klopidogrél, kalcineurininhibitorok, Shiga-toxin-mediált esetben súlyos neurológiai tünetek jelentkezésekor, Streptococcus pneumoniae okozta kórképben, haemopoeticusőssejt-transzplantációval összefüggően

HELLP-szindróma

- egyéni megítélés alapján post partum, amennyiben a Thr szám < 100 000

Súlyos korai preeclapsia

egyéni megítélés alapján 28. terh. hét előtti kezdetű, de azonnali terminálást még nem igénylő esetekben lipid-apheresis

Nephrogen szisztémás fibrosis

egyéni megítélés alapján fotoferezis